

ミヤコカブリダニ剤

有効成分：ミヤコカブリダニ 2,000頭/250ml

その他の成分：鉱物質

性状：淡褐色細粒

包装：250ml ポリエチレンボトル (2,000頭入り)

使用上の注意事項

- 本剤はハダニ類を捕食する天敵ミヤコカブリダニを含む製剤である。
- ミヤコカブリダニの生存日数は短いので、入手後直ちに使用し、使い切ること。
- 容器中でミヤコカブリダニが偏在していることがあるので、使用の際には容器を横にしてゆっくりと回転させて均一に混和した後、葉上へ少量に分けて圃場に均一に放飼すること。
- ハダニ類の生息密度が高くなってからの放飼では十分な効果が得られないことがあるので、ハダニ類がまだ低密度で散見された時点で最初の放飼をすること。なお、ハダニ類の発生は均一ではないので、ハダニ類の密度の高い場所へ重点的に放飼することが望ましい。
- ミヤコカブリダニが天敵として有効な密度を保つため、ハダニ類の発生初期より約1週間隔隔で数回放飼することが望ましい。
- ミヤコカブリダニの活動に影響を及ぼす恐れがあるので、本剤の放飼前後の薬剤散布は避けること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- 通常の使用方法においてはその該当がない。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- この登録に係る使用方法では該当がない。

天敵

農林水産省登録第22894号

ミヤコトツブ

Miyako-

Top

ミヤコカブリダニ剤

引火し爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

- 通常の使用方法においてはその該当がない。

貯蔵上の注意事項

- 本剤は天敵生物であり、生存日数が短いので、入手後直ちに使用し、保存しないこと。

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期
野菜類 (施設栽培)	ハダニ類	約2,000~ 6,000頭/10a	発生初期

本剤の使用回数	使用方法	ミヤコカブリダニを含む農薬の総使用回数
-	放飼	-

最終有効年月日

ラベル外に記載

販売

株式会社アグリセクト
茨城県稲敷市沼田 2629-1

製造

株式会社アグリ総研 稲敷事業所
茨城県稲敷市沼田 2629-1

バイオベスト N.V. ウェスター口工場
ベルギー王国
イスルヴェルデン18 2260

アソシエイト インセクタリ カルフォルニア工場
アメリカ合衆国 カルフォルニア州
サンタポーラ通り 1400

