

# 天敵

農林水産省登録第22757号

## ツヤトップ25

# Tsuya-

オンシツツヤコバチ剤

# Top25

## オンシツツヤコバチ剤

有効成分：オンシツツヤコバチ羽化雌成虫 25頭/カード  
性状：黒色寄生蛹 包装：100カード/紙箱

### 使用上の注意事項

- 本剤はオンシツコナジラミ幼虫に寄生する天敵オンシツツヤコバチの寄生蛹（マミー）をカードに貼付した製剤である。
- オンシツツヤコバチの生存日数は短いので、入手後直ちに使用し、使い切ること。
- カードは25～30株当たり2カードの割合で枝などに釣り下げて放飼すること。
- オンシツコナジラミの生息密度が高くなってからの放飼では十分な効果が得られないことがあるので、オンシツコナジラミが散見された時点で最初の放飼をすること。
- 天敵としてオンシツツヤコバチが有効な密度（1株当たり約2頭）を保つため、オンシツコナジラミの発生初期より約1週間間隔で数回放飼することが望ましい。
- 本剤の使用中は、日中の施設内の平均室温を20～27℃に保つことが望ましい。
- オンシツツヤコバチの活動に影響を及ぼす恐れがあるので、本剤の放飼前後の薬剤散布は避けること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理すること。

### 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オンシツツヤコバチを含む農薬の総使用回数
野菜類 (施設栽培)	オンシツコナジラミ	25～30株 当たり2カード	発生初期	—	放飼	—

### 貯蔵上の注意事項

- 本剤は天敵生物であり、生存日数が短いので、入手後直ちに使用し、保存しないこと。

### 最終有効年月

入手後直ちに使用すること

### 販売

株式会社アグリセクト 茨城県稲敷市沼田 2629-1

### 製造

株式会社アグリ総研 稲敷事業所  
茨城県稲敷市沼田 2629-1

バイオベスト N.V. ウェスター工場  
ベルギー王国イスルヴェルデン18 2260

アプラインバイオニクス ビクトリア工場  
カナダ プリティッシュコロンビア州  
北サーニッチ 西サーニッチ通り 1174

バイオリジカルサービス ロクストン工場  
オーストラリア 南オーストラリア州  
ロクストン ブックパーニングロード 1801

